ETIOPÍA

RIESGO ALTO

MÁS INFORMACIÓN

PROFILAXIS RECOMENDADA

- Prevención de la picadura de mosquito
- Se recomienda quimioprofilaxis SOLO en áreas de riesgo: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina

ÁREAS DE RIESGO

Alto. En todas las zonas bajas del país (por debajo de los 2200 metros, sobre todo en este y oeste)

Moderado. En el resto

No hay riesgo. En Addis Abeba, ni en la mayor parte del llamado "Circuito Histórico", que comprende Gondar, Axum y Lalibela (pero no así en Bahir Dar)

Puede interesar
Un 27 % de la población vive en zonas de alta incidencia; un 41% en zonas de baja incidencia y un 32 % en zonas libres de malaria



Incidencia de casos estimados (1.000 hab.)

Precipitación (mm/m²) y temperatura (ºC) medias

MESES DE TRANSMISIÓN

Todo el año, principalmente en la estación lluviosa entre **junio** y **noviembre**

ALGUNAS CIFRAS

2021. Estimados 3 783 896 casos y 8 041 muertes

2020. Estimados 4 231 328 casos y 9 433 muertes

2019. Estimados 2 645 193 casos y 5 708 muertes

RESISTENCIAS

Existe resistencia a la cloroquina

FORMAS DE MALARIA

Plasmodium falciparum (50%), *P. vivax* (50%)

ESPECIES DE MOSQUITO

Anopheles arabiensis
Anopheles pharoensis
Anopheles funestus
Anopheles nili
Anopheles stephensi
(2018) en zonas urbanas

© Fundación iO. Heimdllr Project. Última actualización: 30 junio 2023