NEPAL

RIESGO BAJO

MÁS INFORMACIÓN

PROFILAXIS RECOMENDADA

- Prevención de la picadura de mosquito
- Se recomienda quimioprofilaxis SOLO en áreas de riesgo: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina

ÁREAS DE RIESGO

Bajo. En las áreas rurales fronterizas con India de los 20 distritos del Terai, incluyendo las zonas boscosas (franja sur en la frontera con India) y en los valles del interior Udaypur, Sindhupalchowk, Makwanpur, Chitwan y Dang. También el parque nacional de Chitwan

Muy bajo. En el resto de la franja sur por debajo de 1000 metros

No hay riesgo. En Katmandú ni en los típicos trekkings del Himalaya

Puede interesar
El país se enfrenta al problema de los frecuentes casos importados de la vecina India, que pueden originar transmisión local

En 2017 el 5 % de la población vivía en zonas de alta transmisión



MESES DE TRANSMISIÓN

Todo el año. Principalmente en la estación lluviosa de **julio** a **octubre**

ALGUNAS CIFRAS

2021. Notificados 106 casos, ningún fallecido

2020. Notificados 245 casos. No hubo muertes

2019. Notificados 464 casos. No hubo fallecidos

RESISTENCIAS

Existe resistencia a la cloroquina

FORMAS DE MALARIA

Plasmodium vivax (84 %), *Plasmodium falciparum* (16 %) casos aislados de *P. malariae*, *P. ovale* y *P. Knowlesi*

ESPECIES DE MOSQUITO

Anopheles fluviatilis
Anopheles annularis
Anopheles maculatus

© Fundación iO. Heimdllr Project. Última actualización: 30 junio 2023